

別添資料

●冬まき 12/上～2/中は種
(2/上～4/中 収穫予定分) : 1月申請

特別栽培農産物 (こまつな)

J A さいかつ吉川園芸部

1. 生産者名、申請面積及び地番

氏名 上原 勉 自宅住所 吉川市 関新田 1-110

2. ほ場地番

面積 (m²)

<u>関新田</u>	<u>1-198</u>	<u>850</u>
<u>〃</u>	<u>1-118</u>	<u>400</u>
<u>〃</u>	<u>1-112</u>	<u>600</u>
<u>〃</u>	<u>1-164</u>	<u>1000</u>
合計		<u>2850 m²</u>

3. 使用肥料 (10a 当たり使用量を記入する) **化学肥料 (窒素量) 8.5kg/10a まで**

- ・ 有機アグレット825eco kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・ エコレット866 (有機態4.1%) 120 kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 kg/10a)
- ・ 上記以外 kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 kg/10a)

4. 使用農薬

使用農薬名称	化学合成 農薬成分数	使用量 (10a)	使用時期	使用農薬に ○を付ける
チウラム	1	—	種子消毒	○
アゾキシストロビン2%・メタラ キシルM1%(ユニフォーム粒剤)	2	9kg	播種時・1回	
ダイアジノン5.0%(ダイアジノン粒剤5)	1	6kg	播種時・1回	
テフルトリン0.5%(フォース粒剤)	1	4kg	播種時・1回	
ジノテフラン1%(スタークル粒剤)	1	6kg	播種時・1回	
ジノテフラン20% (スタークル顆粒水溶剤)	1	2000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫3日前まで	○
シペルメトリン6.0% (アグロスリン乳剤)	1	2000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫前日まで	
アセタミプリド20.0% (モスピラン水溶剤)	1	4000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫7日前まで	○
スピノサド25.0% (スピノエース顆粒水和剤)	0	5000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫14日前まで	○
BT剤 (トアロー水和剤CT) (エコマスターBT)	0	1000倍、 100ℓ	播種後1回以内 収穫前日まで	
ジアゾファミド9.4% (ランマンフロアブル)	1	2000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫3日前まで	○
クロラントラニリプロール5% (プレバソソフロアブル5)	1	2000倍 100ℓ	収穫前日まで 2回以内	
アミスルブロム17.7% (ライメイフロアブル)	1	2000～4000 倍 100ℓ	収穫3日前まで 3回以内	
上記以外の農薬 フロンサイド	1	10g/30kg	播種前	○
使用した化学合成農薬成分の合計	5			5

※ 使用出来る化学合成農薬成分は**5つまで**です。