

別添資料

●夏まき 6/上~9/上は種  
(7/上~10/上 収穫予定分): 6月申請

特別栽培農産物 (こまつな)

J A さいかつ吉川園芸部

1. 生産者名 申請面積及び地番

氏名 三野 輪 進 自宅住所 吉川市 肉新田 1138

2. ほ場地番

面積 (㎡)

|                 |                   |              |
|-----------------|-------------------|--------------|
| <u>大字肉新田字堤通</u> | <u>1127, 1137</u> | <u>620</u>   |
| <u>〃</u>        | <u>1139, 1140</u> | <u>1,369</u> |
| <u>肉新田 2-90</u> |                   | <u>390</u>   |
|                 |                   |              |
|                 |                   |              |
|                 |                   |              |

合計 2,379㎡

3. 使用肥料 (10a 当たり使用量を記入する) 化学肥料 (窒素量) 5 kg/10a まで

- ・有機アグレット825eco      kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・エコレット866 (有機態4.1%) 100 kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 2.9 kg/10a)
- ・上記以外      kg/10a 使用 (化学肥料窒素量      kg/10a)

4. 使用農薬

| 使用農薬名称                              | 化学合成<br>農薬成分数 | 使用量<br>(10a)                       | 使用時期                | 使用農薬に<br>○を付ける |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| チウラム                                | 1             | —                                  | 種子消毒                | ○              |
| アゾキシストロビン2%・メタラ<br>キシルM1%(ユニフォーム粒剤) | 2             | 9kg                                | 播種時・1回              |                |
| ダイアジノン5.0%(ダイアジノン粒剤5)               | 1             | 6kg                                | 播種時・1回              | ○              |
| テフルトリン0.5%(フォース粒剤)                  | 1             | 4kg                                | 播種時・1回              |                |
| ジノテフラン1%(スタークル粒剤)                   | 1             | 6kg                                | 播種時・1回              |                |
| ジノテフラン20%<br>(スタークル顆粒水溶剤)           | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫3日前まで  | ○              |
| シペルメトリン6.0%<br>(アグロスリン乳剤)           | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫前日まで   |                |
| アセタミプリド20.0%<br>(モスピラン水溶剤)          | 1             | 4000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫7日前まで  | ○              |
| スピノサド25.0%<br>(スピノエース顆粒水和剤)         | 0             | 5000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫14日前まで | ○              |
| BT剤 (トアロー水和剤CT)<br>(エコマスターBT)       | 0             | 1000倍、<br>100% <sub>100</sub>      | 播種後1回以内<br>収穫前日まで   |                |
| ジアゾファミド9.4%<br>(ランマンフロアブル)          | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫3日前まで  | ○              |
| クロラントラニリプロール5%<br>(プレバソフロアブル5)      | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 収穫前日まで<br>2回以内      | ○              |
| アミスルフロム17.7%<br>(ライメイフロアブル)         | 1             | 2000~4000<br>倍 100% <sub>100</sub> | 収穫3日前まで<br>3回以内     |                |
| 上記以外の農薬<br>トレファー/サイト乳剤              | 1             | 150~200 ml<br>100% <sub>100</sub>  | 播種時 1回              | ○              |
| 使用した化学合成農薬成分の合計                     | <u>7</u>      |                                    |                     |                |

※使用出来る化学合成農薬成分は7つまでです。